

Université Paris II - Institut de Melun
Préentré Licence Économie-gestion

Mathématiques

Matthieu Richard - matthieu.richard@centraliens.net

Mardi 26 septembre 2017

Sommaire

- 1 Les fonctions : base de la modélisation en économie
- 2 Les principales fonctions
- 3 Le vocabulaire des fonctions

Exemple de problème économique

Le bureau des élèves souhaite proposer aux étudiants un sweat aux couleurs de l'université. Un fournisseur lui propose les sweats dûment floqués à 20 euros l'unité. Les frais de livraison s'élèvent à 100 €.

- Combien coûterait l'achat de 10 sweats ? de 30 sweats ?
- Le bureau des élèves souhaiterait disposer d'un support graphique représentant les dépenses qu'il engagerait en fonction du nombre de sweats achetés. Que proposez-vous ?

Exemple de problème économique

Le bureau des élèves souhaite proposer aux étudiants un sweat aux couleurs de l'université. Un fournisseur lui propose les sweats dûment floqués à 20 euros l'unité. Les frais de livraison s'élèvent à 100 €.

- Combien coûterait l'achat de 10 sweats ? de 30 sweats ?
- Le bureau des élèves souhaiterait disposer d'un support graphique représentant les dépenses qu'il engagerait en fonction du nombre de sweats achetés. Que proposez-vous ?

Exemple de problème économique

Le bureau des élèves souhaite proposer aux étudiants un sweat aux couleurs de l'université. Un fournisseur lui propose les sweats dûment floqués à 20 euros l'unité. Les frais de livraison s'élèvent à 100 €.

Formalisation du problème :

- Dépenses =
prix d'un sweat \times nb de sweats achetés + frais de livraison
- $D(x) = 20 \times x + 100$
où $D(x)$ représente les dépenses du bureau des élèves (en euros) et x le nombre de sweats achetés.

Exemple de problème économique

Le bureau des élèves souhaite proposer aux étudiants un sweat aux couleurs de l'université. Un fournisseur lui propose les sweats dûment floqués à 20 euros l'unité. Les frais de livraison s'élèvent à 100 €.

Formalisation du problème :

- Dépenses =
prix d'un sweat \times nb de sweats achetés + frais de livraison
- $D(x) = 20 \times x + 100$
où $D(x)$ représente les dépenses du bureau des élèves (en euros) et x le nombre de sweats achetés.
- La fonction $D(x) = 20x + 100$ permet ainsi de calculer les dépenses du bureau des élèves pour n'importe quelle quantité x de sweats achetés.

Ainsi 10 sweats coûtent $D(10) = 20 \times 10 + 100 = 300$ €.

Exemple de problème économique

Le bureau des élèves souhaite proposer aux étudiants un sweat aux couleurs de l'université. Un fournisseur lui propose les sweats dûment floqués à 20 euros l'unité. Les frais de livraison s'élèvent à 100 €.


Formalisation du problème :

- Dépenses =
prix d'un sweat \times nb de sweats achetés + frais de livraison
- $D(x) = 20x + 100$
où $D(x)$ représente les dépenses du bureau des élèves (en euros) et x le nombre de sweats achetés.
- La fonction $D(x) = 20x + 100$ permet ainsi de calculer les dépenses du bureau des élèves pour n'importe quelle quantité x de sweats achetés.

Ainsi 10 sweats coûtent $D(10) = 20 \times 10 + 100 = 300$ €.

Exemple de problème économique

Représentation graphique :



Exemple de problème économique (2)

Les recettes de la vente de sweats sont destinées à financer des activités pour les étudiants. Le bureau des élèves pense pouvoir vendre 10 sweats s'ils sont vendus à 50 €, 20 s'ils sont vendus à 40 €, 30 s'ils sont vendus à 30 € et ainsi de suite...

- Quelles seraient les recettes si le bureau des élèves vendait 10 sweats ? 30 sweats ?
- Représenter graphiquement les recettes de la vente de sweats en fonction du nombre de sweats vendus.

Exemple de problème économique (2)

Les recettes de la vente de sweats sont destinées à financer des activités pour les étudiants. Le bureau des élèves pense pouvoir vendre 10 sweats s'ils sont vendus à 50 €, 20 s'ils sont vendus à 40 €, 30 s'ils sont vendus à 30 € et ainsi de suite...

- Quelles seraient les recettes si le bureau des élèves vendait 10 sweats ? 30 sweats ?
- Représenter graphiquement les recettes de la vente de sweats en fonction du nombre de sweats vendus.

Exemple de problème économique (2)

Les recettes de la vente de sweats sont destinées à financer des activités pour les étudiants. Le bureau des élèves pense pouvoir vendre 10 sweats s'ils sont vendus à 50 €, 20 s'ils sont vendus à 40 €, 30 s'ils sont vendus à 30 € et ainsi de suite...

- On note x le nombre de sweats vendus et $p(x)$ le prix de vente unitaire d'un sweat lorsque x sweats sont vendus. D'après l'énoncé, $p(x) = 60 - x$.
- Recettes = nb de sweats vendus \times prix de vente unitaire

Exemple de problème économique (2)

Les recettes de la vente de sweats sont destinées à financer des activités pour les étudiants. Le bureau des élèves pense pouvoir vendre 10 sweats s'ils sont vendus à 50 €, 20 s'ils sont vendus à 40 €, 30 s'ils sont vendus à 30 € et ainsi de suite...

- On note x le nombre de sweats vendus et $p(x)$ le prix de vente unitaire d'un sweat lorsque x sweats sont vendus. D'après l'énoncé, $p(x) = 60 - x$.
- Recettes = nb de sweats vendus \times prix de vente unitaire
- $R(x) = x \times p(x) = x \times (60 - x) = 60x - x^2$.

Exemple de problème économique (2)

Les recettes de la vente de sweats sont destinées à financer des activités pour les étudiants. Le bureau des élèves pense pouvoir vendre 10 sweats s'ils sont vendus à 50 €, 20 s'ils sont vendus à 40 €, 30 s'ils sont vendus à 30 € et ainsi de suite...

- On note x le nombre de sweats vendus et $p(x)$ le prix de vente unitaire d'un sweat lorsque x sweats sont vendus. D'après l'énoncé, $p(x) = 60 - x$.
- Recettes = nb de sweats vendus \times prix de vente unitaire
- $R(x) = x \times p(x) = x \times (60 - x) = 60x - x^2$.
- Pour 10 sweats vendus, les recettes s'élèvent à :
 $R(10) = 60 \times 10 - 10^2 = 600 - 100 = 500$ €.


Exemple de problème économique (2)

Les recettes de la vente de sweats sont destinées à financer des activités pour les étudiants. Le bureau des élèves pense pouvoir vendre 10 sweats s'ils sont vendus à 50 €, 20 s'ils sont vendus à 40 €, 30 s'ils sont vendus à 30 € et ainsi de suite...

- On note x le nombre de sweats vendus et $p(x)$ le prix de vente unitaire d'un sweat lorsque x sweats sont vendus. D'après l'énoncé, $p(x) = 60 - x$.
- Recettes = nb de sweats vendus \times prix de vente unitaire
- $R(x) = x \times p(x) = x \times (60 - x) = 60x - x^2$.
- Pour 10 sweats vendus, les recettes s'élèvent à :
 $R(10) = 60 \times 10 - 10^2 = 600 - 100 = 500$ €.

Exemple de problème économique (2)

- Représentation graphique :



Exemple de problème économique (3)

Le bureau des élèves souhaite proposer aux étudiants un sweat aux couleurs de l'université. Un fournisseur lui propose les sweats dûment floqués à 20 euros l'unité. Les frais de livraison s'élèvent à 100 €.

Les recettes de la vente de sweats sont destinées à financer des activités pour les étudiants. Le bureau des élèves pense pouvoir vendre 10 sweats s'ils sont vendus à 50 €, 20 s'ils sont vendus à 40 €, 30 s'ils sont vendus à 30 € et ainsi de suite...

- Combien de sweats le bureau des élèves doit-il commander s'il souhaite maximiser l'argent récolté lors de la vente ?

Exemple de problème économique (3)

- Bénéfice = Recettes - Dépenses
- Recettes : $R(x) = 60x - x^2$.

Exemple de problème économique (3)

- Bénéfice = Recettes - Dépenses
- Recettes : $R(x) = 60x - x^2$.
- Dépenses : $D(x) = 20x + 100$.

Exemple de problème économique (3)


- Bénéfice = Recettes - Dépenses
- Recettes : $R(x) = 60x - x^2$.
- Dépenses : $D(x) = 20x + 100$.
- Bénéfice :
 $B(x) = R(x) - D(x)$
 $B(x) = 60x - x^2 - (20x + 100)$
 $B(x) = -x^2 - 40x - 100$.

Exemple de problème économique (3)

- Bénéfice = Recettes - Dépenses
- Recettes : $R(x) = 60x - x^2$.
- Dépenses : $D(x) = 20x + 100$.
- Bénéfice :
$$B(x) = R(x) - D(x)$$
$$B(x) = 60x - x^2 - (20x + 100)$$
$$B(x) = -x^2 - 40x - 100.$$

Exemple de problème économique (3)

- Représentation graphique :




Le bénéfice est maximal lorsque le bureau des élèves commande 20 sweats. Le bureau des élèves récolte alors 300 € pour financer des activités pour les étudiants.

Fonctions affines


Définition

On appelle fonction affine une fonction du type $f(x) = ax + b$.

Exemples : $f(x) = 0,5x - 1$



et $f(x) = -x + 2$.




La courbe représentative d'une fonction affine est une droite.

Fonctions polynomiales de degré 2


Définition

On appelle fonction polynomiale de degré 2 une fonction du type $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Exemples : $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$



et $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 1$.




Leur courbe représentative est une parabole.

Fonction racine carrée

Définition

On appelle fonction racine carrée la fonction du type $f(x) = \sqrt{x}$.




Sa courbe représentative est une demi-parabole.

Fonction inverse

Définition

On appelle fonction inverse la fonction du type $f(x) = \frac{1}{x}$.




Sa courbe représentative est une hyperbole.

Logarithme

Définition

On appelle *logarithme népérien* l'unique fonction notée \ln admettant pour dérivée $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ et vérifiant $\ln(1) = 0$.




Propriétés :

- \ln est strictement croissante sur \mathbb{R}_+^* .
- $\ln(e) = 1$

Logarithme

Définition

On appelle *logarithme népérien* l'unique fonction notée \ln admettant pour dérivée $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ et vérifiant $\ln(1) = 0$.




Propriétés :

- \ln est strictement croissante sur \mathbb{R}_+^* .
- $\ln(e) = 1$
- $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$

Logarithme

Définition

On appelle logarithme népérien l'unique fonction notée \ln admettant pour dérivée $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ et vérifiant $\ln(1) = 0$.




Propriétés :

- \ln est strictement croissante sur \mathbb{R}_+^* .
- $\ln(e) = 1$
- $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$
- $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$

Logarithme

Définition

On appelle *logarithme népérien* l'unique fonction notée \ln admettant pour dérivée $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ et vérifiant $\ln(1) = 0$.




Propriétés :

- \ln est strictement croissante sur \mathbb{R}_+^* .
- $\ln(e) = 1$
- $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$
- $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$
- $\ln(x^p) = p \ln(x)$

Logarithme

Définition

On appelle *logarithme népérien* l'unique fonction notée \ln admettant pour dérivée $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ et vérifiant $\ln(1) = 0$.




Propriétés :

- \ln est strictement croissante sur \mathbb{R}_+^* .
- $\ln(e) = 1$
- $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$
- $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$
- $\ln(x^p) = p \ln(x)$

Exponentielle

Définition

La fonction exponentielle, notée \exp , est la fonction réciproque de la fonction logarithme.



Notation : $e^x = \exp(x)$.


Propriétés :

- \exp est strictement croissante sur \mathbb{R} .
- $\exp(0) = 1$

Exponentielle

Définition

La fonction exponentielle, notée \exp , est la fonction réciproque de la fonction logarithme.



Notation : $e^x = \exp(x)$.


Propriétés :

- \exp est strictement croissante sur \mathbb{R} .
- $\exp(0) = 1$
- $e^{x+y} = e^x \times e^y$

Exponentielle

Définition

La fonction exponentielle, notée \exp , est la fonction réciproque de la fonction logarithme.



Notation : $e^x = \exp(x)$.


Propriétés :

- \exp est strictement croissante sur \mathbb{R} .
- $\exp(0) = 1$
- $e^{x+y} = e^x \times e^y$
- $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$

Exponentielle

Définition

La fonction exponentielle, notée \exp , est la fonction réciproque de la fonction logarithme.



Notation : $e^x = \exp(x)$.


Propriétés :

- \exp est strictement croissante sur \mathbb{R} .
- $\exp(0) = 1$
- $e^{x+y} = e^x \times e^y$
- $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$
- $e^{px} = [e^x]^p$

Exponentielle

Définition

La fonction exponentielle, notée \exp , est la fonction réciproque de la fonction logarithme.



Notation : $e^x = \exp(x)$.

Propriétés :

- \exp est strictement croissante sur \mathbb{R} .
- $\exp(0) = 1$
- $e^{x+y} = e^x \times e^y$
- $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$
- $e^{px} = [e^x]^p$

Autres fonctions

Il existe de nombreuses autres fonctions usuelles :

- les fonctions polynomiales de degré supérieur à 2
- les fractions rationnelles (quotients de 2 polynômes)

La grande majorité des fonctions que vous rencontrerez sont constituées de sommes, produits, quotients de différentes fonctions usuelles.

Autres fonctions

Il existe de nombreuses autres fonctions usuelles :

- les fonctions polynomiales de degré supérieur à 2
- les fractions rationnelles (quotients de 2 polynômes)
- les fonctions trigonométriques : sinus, cosinus, tangente,...

La grande majorité des fonctions que vous rencontrerez sont constituées de sommes, produits, quotients de différentes fonctions usuelles.

Autres fonctions

Il existe de nombreuses autres fonctions usuelles :

- les fonctions polynomiales de degré supérieur à 2
- les fractions rationnelles (quotients de 2 polynômes)
- les fonctions trigonométriques : sinus, cosinus, tangente,...
- etc...

La grande majorité des fonctions que vous rencontrerez sont constituées de sommes, produits, quotients de différentes fonctions usuelles.

Autres fonctions

Il existe de nombreuses autres fonctions usuelles :

- les fonctions polynomiales de degré supérieur à 2
- les fractions rationnelles (quotients de 2 polynômes)
- les fonctions trigonométriques : sinus, cosinus, tangente,...
- etc...


La grande majorité des fonctions que vous rencontrerez sont constituées de sommes, produits, quotients de différentes fonctions usuelles.

Exercices

Reconnaître les fonctions suivantes...


Le vocabulaire des fonctions

- La fonction :
 $f(x) = -x^2 + 2x + 1.$
- La courbe représentative de
 $f : C_f.$



Le vocabulaire des fonctions


- La fonction :
 $f(x) = -x^2 + 2x + 1$.
- La courbe représentative de f : C_f .



- L'ensemble de définition :
 $D_f =$

Le vocabulaire des fonctions


- La fonction :
 $f(x) = -x^2 + 2x + 1$.
- La courbe représentative de f : C_f .



- L'ensemble de définition :
 $D_f =$
- La monotonie :
 f est croissante sur...
 f est décroissante sur...

Le vocabulaire des fonctions


- La fonction :
 $f(x) = -x^2 + 2x + 1$.
- La courbe représentative de f : C_f .



- L'ensemble de définition :
 $D_f =$
- La monotonie :
 f est croissante sur...
 f est décroissante sur...
- Les extremums éventuels :
maximum
minimum

Le vocabulaire des fonctions


- La fonction :
 $f(x) = -x^2 + 2x + 1$.
- La courbe représentative de f : C_f .



- L'ensemble de définition :
 $D_f =$
- La monotonie :
 f est croissante sur...
 f est décroissante sur...
- Les extremums éventuels :
maximum
minimum
- La dérivée :
 $f'(x) =$

Le vocabulaire des fonctions

- La fonction :
 $f(x) = -x^2 + 2x + 1$.
- La courbe représentative de f : C_f .



- L'ensemble de définition :
 $D_f =$
- La monotonie :
 f est croissante sur...
 f est décroissante sur...
- Les extremums éventuels :
maximum
minimum
- La dérivée :
 $f'(x) =$

Exercices (1)

- La fonction :
 $f(x) = x^3 - x + 1.$
- La courbe représentative de
 $f : C_f.$


Exercices (1)

- La fonction :
 $f(x) = x^3 - x + 1.$
- La courbe représentative de
 $f : C_f.$



Exercices (1)


- La fonction :
 $f(x) = x^3 - x + 1.$
- La courbe représentative de
 $f : C_f.$



- L'ensemble de définition :
 $D_f =$

Exercices (1)


- La fonction :
 $f(x) = x^3 - x + 1.$
- La courbe représentative de
 $f : C_f.$



- L'ensemble de définition :
 $D_f =$
- La monotonie :
 f est croissante sur...
 f est décroissante sur...

Exercices (1)


- La fonction :
 $f(x) = x^3 - x + 1$.
- La courbe représentative de
 $f : C_f$.



- L'ensemble de définition :
 $D_f =$
- La monotonie :
 f est croissante sur...
 f est décroissante sur...
- Les extremums éventuels :
maximum
minimum

Exercices (1)

- La fonction :
 $f(x) = x^3 - x + 1$.
- La courbe représentative de
 $f : C_f$.



- L'ensemble de définition :
 $D_f =$
- La monotonie :
 f est croissante sur...
 f est décroissante sur...
- Les extremums éventuels :
maximum
minimum
- La dérivée :
 $f'(x) =$

Exercices (1)

- La fonction :
 $f(x) = x^3 - x + 1$.
- La courbe représentative de
 $f : C_f$.




- L'ensemble de définition :
 $D_f =$
- La monotonie :
 f est croissante sur...
 f est décroissante sur...
- Les extremums éventuels :
maximum
minimum
- La dérivée :
 $f'(x) =$

Exercices (2)

- La fonction :
$$f(x) = \frac{1}{x-2}.$$
- La courbe représentative de
 $f : C_f.$


Exercices (2)

- La fonction :
$$f(x) = \frac{1}{x-2}.$$
- La courbe représentative de
 $f : C_f.$




Exercices (2)

- La fonction :
$$f(x) = \frac{1}{x-2}.$$
 - La courbe représentative de
 $f : C_f.$
- L'ensemble de définition :
 $D_f =$



Exercices (2)


- La fonction :
$$f(x) = \frac{1}{x-2}.$$
- La courbe représentative de $f : C_f$.



- L'ensemble de définition :
 $D_f =$
- La monotonie :
 f est croissante sur...
 f est décroissante sur...

Exercices (2)


- La fonction :
$$f(x) = \frac{1}{x-2}$$
- La courbe représentative de $f : C_f$.



- L'ensemble de définition :
 $D_f =$
- La monotonie :
 f est croissante sur...
 f est décroissante sur...
- Les extremums éventuels :
maximum
minimum

Exercices (2)


- La fonction :
 $f(x) = \frac{1}{x-2}$.
- La courbe représentative de
 $f : C_f$.



- L'ensemble de définition :
 $D_f =$
- La monotonie :
 f est croissante sur...
 f est décroissante sur...
- Les extremums éventuels :
maximum
minimum
- La dérivée :
 $f'(x) =$

Exercices (2)

- La fonction :
 $f(x) = \frac{1}{x-2}$.
- La courbe représentative de
 $f : C_f$.




- L'ensemble de définition :
 $D_f =$
- La monotonie :
 f est croissante sur...
 f est décroissante sur...
- Les extremums éventuels :
maximum
minimum
- La dérivée :
 $f'(x) =$

Exercices (3)

- La fonction :
 $f(x) = \ln(x + 2)$.
- La courbe représentative de
 $f : C_f$.


Exercices (3)

- La fonction :
 $f(x) = \ln(x + 2)$.
- La courbe représentative de
 $f : C_f$.




Exercices (3)

- La fonction :
 $f(x) = \ln(x + 2)$.
 - La courbe représentative de
 $f : C_f$.
- L'ensemble de définition :
 $D_f =$



Exercices (3)


- La fonction :
 $f(x) = \ln(x + 2)$.
- La courbe représentative de
 $f : C_f$.



- L'ensemble de définition :
 $D_f =$
- La monotonie :
 f est croissante sur...
 f est décroissante sur...

Exercices (3)


- La fonction :
 $f(x) = \ln(x + 2)$.
- La courbe représentative de
 $f : C_f$.



- L'ensemble de définition :
 $D_f =$
- La monotonie :
 f est croissante sur...
 f est décroissante sur...
- Les extremums éventuels :
maximum
minimum

Exercices (3)


- La fonction :
 $f(x) = \ln(x + 2)$.
- La courbe représentative de
 $f : C_f$.



- L'ensemble de définition :
 $D_f =$
- La monotonie :
 f est croissante sur...
 f est décroissante sur...
- Les extremums éventuels :
maximum
minimum
- La dérivée :
 $f'(x) =$

Exercices (3)

- La fonction :
 $f(x) = \ln(x + 2)$.
- La courbe représentative de
 $f : C_f$.



- L'ensemble de définition :
 $D_f =$
- La monotonie :
 f est croissante sur...
 f est décroissante sur...
- Les extremums éventuels :
maximum
minimum
- La dérivée :
 $f'(x) =$

Bibliographie

Tout livre de Première et Terminale S ou ES

Van de Craats, Bosch, *Tout ce que vous avez appris et oublié en maths!*, Pearson